

Syntyysvaikeudet

Rajan vetäminen normaalin ja epänormaalin synnytyksen välille on joskus hyvin vaikeaa. Jotain on kuitenkin pielessä, kun:

polttoheikkous:

1. Synnytys ei käynnisty 24 tunnin sisällä nartun ruumiinlämmön laskusta.
2. Pentujen väli venyy yli 3 tunnin synnytyksestä.
3. Pentua ei ala kuulua supistusten jatkuttua voimakkaina 2-3 tuntia.

Tunnista riskisyntyttäjä ja vaurio mahdollisiin vaikeuksiin.

Riskisyntyttäjiä ovat:

1. Tiedetyt rodut "normaalisti". Toyroduilla sikiöiden koko emon kokoon nähden on usein niin suuri, että se muodostuu synnytyksesteeksi.

Lyttykuonoisilla roduilla sikiöiden päät ovat usein niin suuria, että ne muodostuvat synnytyksesteeksi. **Emoilla** on rakenteestaan johtuen heikot vatsalihakset, mistä on usein seurauksena polttoheikkoutta.

2. Yhden (tai kahden) sikiön tiineydet. Sikiöiden vähäinen määrä ei ilmeisesti anna riittävän suurta hormonaalista stimulaatiota synnytyksen käynnistymiselle, jolloin synnytys ei käynnisty lainkaan. Ainoa(t) sikiö(t) voi(vat) myös kasvaa niin suureksi, että se muodostuu synnytyksesteeksi.

3. Yli 6-vuotiaat ensisyntyttäjät. Vanhat ensisyntyttäjät ovat nuorempia narttuja huonompia synnyttäjiä ja emoja.

4. Sellaiset nartut, joilla on ollut aiemmin abortti, pyometra tai synnytyksestä.

Näin vältät synnytysvaikeuksia

1. Astuta narttu useita kertoja. Saat suuremman pentueen jolloin sikiöt ovat pienempiä ja synnytys helpompi.

2. Liikuta narttua ahkerasti tiineysaikana. Hyvä lihaskunto takaa paremman ponnistusvoiman synnytyksessä.

3. Ruoki oikein kantava narttu. Vältä etenkin ylikuokintaa. Lihava narttu on laiska synnyttäjä. Älä tuuta koiralle liikaa kalkkia. Niin tekemällä saatat lamaannuttaa koiran oman Ca-säätelyjärjestelmän ja koira tulee kärsimään Ca-tasapainon häiriöistä. Seurauksena on polttoheikkoutta.